

ტრავმა და მასიური სისხლდენა

ბანხილული CRASH 2 კვლევისთვის. ტრავმის შემდგომი ჰემორაგიების მკურნალობა ანტიფიბრინოლიტიკებით



შერჩევითობა

- ყველა მოზრდილი პაციენტი (> 16 წელზე) ტრავმიდან პირველი 8 საათის ინტენსივობაში მწვავე სისხლდენით (სისტოლური არტერიული წნევა < 90 mmHg და/ან გულის შეკუმშვათა სიხშირე > 110/წთ) ან სისხლდენის განვითარების რისკით
- ანტიფიბრინოლიზური საშუალებების აუცილებლობის ან უკუჩვენების არ არსებობა

რანდომიზაცია

სატელეფონო ცენტრები

დარეკეთ უფასო რანდომიზაციის სერვისში და მოგვაწოდეთ:

- პაციენტის ინიციალები და სქესი
- დაბადების თარიღი (თუ იცით) ან მიახლოებული ასაკი
- ტრავმიდან გასული დრო და ტიპი
- GCS, SBP, სუნთქვის სიხშირე, კაპილარული ავსების დრო, კულსი.

ბიკარნახებენ სამკურნალო პაკეტის ნომერს-აიღეთ და მიჰქვითთ ინსტრუქციას

არასატელეფონო ცენტრები

შეაფასეთ პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის ფორმა შემდეგი მონაცემებით:

- პაციენტის ინიციალები და სქესი
- დაბადების თარიღი (თუ იცით) ან მიახლოებული ასაკი
- ტრავმიდან გასული დრო და ტიპი
- GCS, SBP, სუნთქვის სიხშირე, კაპილარული ავსების დრო, კულსი.

აიღეთ სამკურნალო პაკეტი ყველაზე დაბალი ნომრით და მიჰქვითთ ინსტრუქციას

მკურნალობა

- 100 მლ (1 გრ ტრანექსამის მუავის ან პლაცებოს) ინფუზია 10 წთ-ის განმავლობაში – დატვირთვის დოზა
- 60 მლ/სთ (120 მგ/სთ ტრანექსამის მუავის ან პლაცებოს) ინფუზია 8 სთ განმავლობაში

მონაცემთა შეგროვება

ერთგვერდიანი გამოსავლის ფორმა ივსება ავამყოფობის ისტორიიდან პაციენტის გაწერის , სიკვდილის ან ტრავმიდან მეოთხე კვირაზე, რომელიც მოხდება პირველი.

24 სთ-იანი რანდომიზაციისთვის

სატელეფონო ცენტრები

უფასო ხარი

(იხ. ნომერი თქვენს საიტ-ფაილში)

არასატელეფონო ცენტრები

უსაფრთხო ვებგვერდი,
ელექტრონული ფორმები,
ელ-ფოსტა ან ფაქსი

(იხ. ინსტრუქცია თქვენს საიტ-ფაილში)

ინფორმაცია და კვლევის მასალები:

CRASH Trials Co-ordinating Centre, LSHTM, Keppel Street, London WC1E 7HT
Tel +44(0)20 7299 4684, Fax +44(0)20 7299 4663, email CRASH@Lshtm.ac.uk
WWW.CRASH2.LSHTM.AC.UK